

Ортодонтия. Брекет-система

Ортодонтия. Снятие брекет-системы и установка ретенционных аппаратов

4 этап: Снятие брекет-системы и установка ретенционных аппаратов

Материалы для работы:

- Готовится на стол до снятия брекет-системы

- Ортодонтический набор
- Боры
- Щетка
- Полировочные головки
- Зеркало
- Пинцет
- Паста полировочная
- Щипцы для снятия
- Ретрактор прямой
- Корректор со скалером
- Проволочный ретейнер
- Кусачки прямые
- Текучий композит
- Бонд ORTHOSOLO
- Аппликатор
- Ортофосфорная кислота
- Марлевые шарики
- Лампа

- Готовится на стол после снятия брекет-системы

- Ложки уточняем у врача
- Альгинатная масса Гидрогум или Упин (уточняем у врача)
- Резиновая чаша
- Шпатель
- Ретракторы: два боковых, окклюзионный
- Окклюзионное зеркало
- Фотоаппарат

Ортодонтия. Брекет-система

Врач

Ассистент

Устанавливает ретрактор в полости рта

Устанавливает щетку и золотой бор в наконечники

Отмеряет необходимое количество ретейнера для фиксации на верхнюю и нижнюю челюсть

Очищает оральную поверхность зубов верхней и нижней челюсти

Периодически необходимо держать слюноотсос

Наносит ортофосфорную кислоту 37% на поверхности зубов на 30 сек.

Готовит пылесос

Смывает ортофосфорную кислоту

Держит пылесос у каждого зуба во время смывания, пылесос тоже в руке, помогает эвакуировать жидкость

Высушивает рабочее поле

Готовит ватные турунды

Наносит и высушивает бонд ORTHOSOLO

Готовит на аппликаторе Бонд ORTHOSOLO

Приступает к фиксации проволочно-композитного ретейнера

Держит слюноотсос в одной руке, в другой – лампу. Отсвечивает каждый зуб по сигналу врача.

После фиксации композитной смолы на верхней и нижней челюсти, иногда проводят фиксацию ретейнера на нижней челюсти.

Проводит снятие брекет-системы щипцами

Заменяет щетку в наконечнике на полировочную головку

Очищает поверхность зубов верхней челюсти от композита сначала бором, затем полировочной головкой

Периодически необходимо держать слюноотсос Готовит всё для слепка (см. раздел «Диагностика»)

После фиксации ретейнера

Снимает альгинатный слепок на

Относит слепок в техническую

Для изготовления

Ортодонтия. Брекет-система

верхней челюсти

лабораторию

капы. В т
необходим
должна б
получаса (

Очищает поверхность зубов нижней
челюсти от композита сначала
бором, затем полировочной
головкой

Периодически необходимо держать
слюноотсос

Проводит фотопротокол

См. раздел «Диагностика»

Пациент п
ожидает р

Приступает к изготовлению
ретенционной капы

Убирает кабинет. Готовит
коробочку для ретенционной капы
для пациента

Время из
минут

Примерка ретенционной капы

Уникальный ID ответа: #1184

Опубликовал: : Алексей Данилов

Последние обновления: 2025-01-16 15:35