

Ортодонтия. Брекет-система

Ортодонтия. Снятие брекет-системы и установка ретенционных аппаратов

4 этап: Снятие брекет-системы и установка ретенционных аппаратов

Материалы для работы:

- Готовится на стол до снятия брекет-системы

- Ортодонтический набор
- Боры
- Щетка
- Полировочные головки
- Зеркало
- Пинцет
- Паста полировочная
- Щипцы для снятия
- Ретрактор прямой
- Корректор со скалером
- Проволочный ретейнер
- Кусачки прямые
- Текучий композит
- Бонд ORTHOSOLO
- Аппликатор
- Ортофосфорная кислота
- Марлевые шарики
- Лампа

- Готовится на стол после снятия брекет-системы

- Ложки уточняем у врача
- Альгинатная масса Гидрогум или Упин (уточняем у врача)
- Резиновая чаша
- Шпатель
- Ретракторы: два боковых, окклюзионный
- Окклюзионное зеркало
- Фотоаппарат

Ортодонтия. Брекет-система

Врач	Ассистент	
Устанавливает ретрактор в полости рта	Устанавливает щетку и золотой бор в наконечники	
Отмеряет необходимое количество ретейнера для фиксации на верхнюю и нижнюю челюсть		
Очищает оральную поверхность зубов верхней и нижней челюсти	Периодически необходимо держать слюноотсос	
Наносит ортофосфорную кислоту 37% на поверхности зубов на 30 сек.	Готовит пылесос	
Смывает ортофосфорную кислоту	Держит пылесос у каждого зуба во время смывания, пылесос тоже в руке, помогает эвакуировать жидкость	
Высушивает рабочее поле	Готовит ватные турунды	
Наносит и высушивает бонд ORTHOSOLO	Готовит на аппликаторе Бонд ORTHOSOLO	
Приступает к фиксации проволочно-композитного ретейнера	Держит слюноотсос в одной руке, в другой – лампу. Отсвечивает каждый зуб по сигналу врача.	После фиксации композитной массы на верхней и нижней челюсти, иногда проводят повторную фиксацию на нижней челюсти.
Проводит снятие брекет-системы щипцами	Заменяет щетку в наконечнике на полировочную головку	После фиксации брекет-системы
Очищает поверхность зубов верхней челюсти от композита сначала бором, затем полировочной головкой	Периодически необходимо держать слюноотсос	
Снимает альгинатный слепок на	Готовит всё для слепка (см. раздел «Диагностика»)	
	Относит слепок в техническую	Для изготовления слепка

Ортодонтия. Брекет-система

верхней челюсти

лабораторию

капы. В т
необходим
должна б
получаса (

Очищает поверхность зубов нижней
челюсти от композита сначала
бором, затем полировочной
головкой

Периодически необходимо держать
слюноотсос

Проводит фотопротокол

См. раздел «Диагностика»

Пациент п
ожидает р

Приступает к изготовлению
ретенционной капы

Убирает кабинет. Готовит
коробочку для ретенционной капы
для пациента

Время из
минут

Примерка ретенционной капы

Уникальный ID ответа: #1184

Опубликовал: : Алексей Данилов

Последнее обновление: 2025-01-16 15:35