

Ортопедия

Снятие альгинатного слепка

№	Этапы	Манипу
1	Включить воду	Включить, тонкий напор воды и в начале крана находится теплая вода, которая застывает и не успеваем замешать, вода сливается до холодной.
2	Подготовка к слепку.	- Посмотреть в рот, для подбора р взять ее из шкафа (2 шт основная - Спросить: есть ли выраженный дать прополоскать соленой водо воды или церрукал за 20 мин до сл - Подготовить:1. "Упин" 2. Колба 3 - Вскрыть основную ложку, ПОМЕ покрывать все зубы на в/ч, закрыв зубов).
3	Подготовка ложки к слепку.	- Если ложка не подходит, ее мож можно подогнуть и разогнуть кра нарастить воском).
4	Примерка ложки в полости рта.	- Просим пациента прикрыть рот уголок рта указательным па отодвигаем уголок рта ложкой, сл пальцем. - ДЕЛАЕМ ЭТО АККУРАТНО, ЧТОБЫ КОМФОРТНО! - Если есть заеды или герпес, смаз - Сажаем пациента ровно и запрокинута (иначе пожет подави - Протереть слизистую от слюны, с - Зубы тоже должны быть чист просушиваем все рабочее поле.
5	Подготовка пацента и рабочего поля для слепка.	ДЛЯ СЪЕМНЫХ: В/Ч - осматриваем альвеолярный отросток спереди если выражено. Решаем будем отд Положить в колбу упин и налить проверить пальцем).
6	Замешивание Упина	

КРАН ПЕРЧАТКАМИ НЕ ТРОГАЕМ!!!

Кол-во Упина: ложка №1 - 1 кол
колпачка (с маленькой горкой)

Равномерно наносим массу на

Ортопедия

углубления для зубов. На верхнюю губу смещаем вестибулярно.

- 7 Внесение слепочной массы в рот
- Смачиваем по верх массы водой. Наносим отдельно УПИН на слизистую. Лучше привыкать делать всегда.
- НЕБО - иначе часто образуются П
 - За бугры справа и слева
 - С вестибулярной стороны, в области
 - На нижней челюсти, под язык, сп
 - А также с вестибулярной стороны
- 8 Для верхней челюсти
- В/Ч: СЗАДИ - НАПЕРЕД, чтобы пациент не давился.
 - В/Ч - подкладываем пальцем массу
 - В/Ч - беремся 2-мя пальцами за уздечку (если губа скользит, можно использовать тампон)
 - В/Ч - снимаем перчатку и через шапку распределяем массу, можно вращать и испачкать пациента слепочной массой
 - Держим ложку самостоятельно. Два больших пальчика справа и слева прижать (показать).
- 9 Для нижней челюсти
- Н/Ч: СПЕРЕДИ-НАЗАД, чтобы масса была в области
 - Н/Ч - подкладываем пальцем массу
 - Н/Ч - беремся 2-мя пальцами за уздечку (если губа скользит, можно использовать тампон)
 - Н/Ч - снимаем перчатку и через шапку распределяем массу, можно вращать и испачкать пациента слепочной массой
 - ЛОЖКА должна стоять ПРЯМО!!!
 - Держим ложку самостоятельно. Два больших пальчика справа и слева прижать (показать).
- 10 Методика выведения слепка из полости рта.
- После ее полного застывания извлекаем для этого в туберальную зону вращательное движение, устранение вакуума, и поворачиваем указательного пальца.

11 Оценка качества ложки

- После выведение ложки с оттиском качество оттиска. Прочность фиксации (без отрыва от ложки).

- Промыть под проточной водой. После выведение ложки с оттиском качество оттиска.

Прочность фиксации оттиска (в ложки)

Четкое, без дефектов отображения

Промыть под проточной водой.

Для предотвращения деформации кладем в холодную воду.

Особенности

1. Если пациента тошнит, даем колбу в руки, наклоняем голову вперед, говорим: "Вся слюна, которая есть, пусть вытекает в колбу, не глотать!" И начинаем повторять постоянно следующее выражение: "Глубоко вдохнули - Выдохнули"!!!
2. Ложку ставим на уровне глаз, т.к. это ориентир для техников и они могут потом сделать зубы наискосок
3. Альгинатные слепки используют: КДМ, съемные, антогонисты.
4. Если слепок не получился, лучше взять новую ложку, (т.к. переснятый слепок может быть хуже), но по ситуации.
5. Альгинатные слепки снимаем сразу, после застывания, иначе будут хрупкими и ломаться.

Уникальный ID ответа: #1325

Опубликовал: : Алексей Данилов

Последние обновление: 2025-03-13 22:00