Ортопедия

Функциональный оттиск индивидуальной ложкой

Этап	Манипуляци
Оценка, примерка и припасовка ложек	Вносим ложку в полость рта и смотрим Спрашиваем пациента, не давит ли ем Если границы ложки избыточны убира Так же убираем пространство под вс щеки, чтобы под тяж было около 2-х м - Между ложкой и переходной склад быть достаточно места для окантовоч не останеться, то клапана не будет и будет. - Ложку обязательно фрезеруем поднутрения. - Одна из важнейших ошибок связанн базис по границам нижней челюсти с в - Избыточная граница - это продавле очередь переснятие слепка. Если ос пациенту будет больно краем, он нев елозить, либо язык сувать под лож увеличивается. - После коррекции по границам л бороздки для большей ретенции оконт
Подготовка ложки к слепку	Далее для стабильной фиксации необх изготовление стоперов на инд. ложках Либо делаем их сами: смазываем адге обильно смачиваем водой гипсовые м ложки, замешиваем немного базы Спи 4 кусочка. Именно 4 - принцип стола на Укладываем ложку на модель и прида гипсом и ложкой было одинаковое рас Держать материал во рту не касаясь л

(c) 2026 Администратор <noreply@3072.ru smileterritory> | 2026-10-31 17:29
URL: https://edu.smileterritory.ru/content/124/353/ru/funkcionalʼnyj-ottisk-individualʼnoj-lozkoj.html

Поэтому надо поставить стопы, которы
- не дают продавиться ложке,
- стабилизируют инд ложку во рту в ед
- оказывают минимальное негативное

Хорошо, когда есть зубы на челюсти
одной из этих точек стабилизации.

Как выбрать другие?
Места самой плотной и стабильной кос
Обычно это область клыков и
ретромалярными буграми. Там наилуч
манипуляции.

Первый этап оттиска - оконтовочный (проснимаем границы)

Пока стопы застывают, обрабатываем
далее смазываем лаком адгезивом нар
Смешиваем ложку базы и активатора В
Получается вязкая, липкая масса.
Скатываем тонкой колбаской и
окантовочный шприц.

Высушиваем полость рта при помощ
марлевыми шариками.

- По кругу выдавливаю массу Bisico
прилепляем к ложке,
- Потом вносим в рот и делаем сами фу
- Формируем тяжи и проснимаем
движений верхней и нижней губы
В/Ч: просим максимально открыть
вправо-влево, свернуть губы в трубочк
Н/Ч: просим максимально открыть рот
влево, выдвинуть язык вперед, дост
выдвинуть язык вперед, к небу, впра
трубочку и тд.)

ВАЖНО: снять маску и проговарив

(c) 2026 Администратор <noreply@3072.ru smileterritory> | 2026-10-31 17:29
URL: https://edu.smileterritory.ru/content/124/353/ru/funkcionalʼnyj-ottisk-individualʼnoj-lozkoj.html

пациент, САМИ ПОКАЗЫВАЕМ!!!!! стандартная ситуация, и он может вариант, показать ему все до слепка. Через минуту пробы повторяем, на слу

Ждем когда материал почти засты силиконовый, податливый и вытаскива Уже сейчас должна появиться присо ложку становится проблемой.
Снимать поэтому аккуратно! придерживаем окантовку к локжке, а саму ложку.

Второй этап оттиска

Высушиваем инд ложку. Обрабатываем её спирто элементом стабилизации в полости рта теперь больше не понадобяться.

Выдавливаем коррегирующую и активатор на палет В это время пациенту говорю сплюнуть, слюн пересушивая воздух и слизистую. Сушим слизо оттиском.

Быстро быстро замешиваем, держа шпатель макси снизить количество пузырей.

Консистенция коррегирующей массы должна бы внесении в ложку и в рот!
ЖИДКОЙ! Не слизеобразной!

Примерное соотношение массы 10 ед к активатору Да, застывает чуть дольше, но снимает качестве участки.

Консистенция коррегирующей массы должна бы силикона из канюли! Тогда качество оттиска будет

Повторяем функциональные пробы из первого э тяжами для их переноса на функциональном оттис

Так же аккуратно извлекаем оттиск во избежании с

Оценка качества оттиска

Проверяем чтобы нигде не было пузы массы, тяжы должны быть просн

(c) 2026 Администратор <noreply@3072.ru smileterritory> | 2026-10-31 17:29

URL: https://edu.smileterritory.ru/content/124/353/ru/funkcionalʼnyj-ottisk-individualʼnoj-lozkoj.html

	соответсвовать состоянию в полости р верхней челюсти должны быть отч слепке. Любой вышеописанный недос за собой переснятие оттиска!
Обработка оттиска	Оттиск обрабатывается водой от вяз ванночку с антисептиком на экспози орашается водой и отправляется в ЗТЛ

P.S. - Пациент не должен испытывать боли при одевании.
- Посмотреть, чтобы при открывании рта, ложка не сбрасывалась.

Ложка = платформа для всего
Хорошая ложка = точный оттиск = точный протез.

Запомни: индивидуальная ложка — это не вспомогательный инструмент, а часть конструкции будущего протеза. С ней начинается вся биомеханика, стабильность и комфорт.

Уникальный ID ответа: #1355
Опубликовал: : Алексей Данилов
Последние обновление: 2025-04-24 14:03

(c) 2026 Администратор <noreply@3072.ru smileterritory> | 2026-10-31 17:29
URL: https://edu.smileterritory.ru/content/124/353/ru/funkcionalʼnyj-ottisk-individualʼnoj-lozkoj.html