Ортопедия

Функциональный оттиск индивидуальной ложкой

Этап	Манипуляци
Оценка, примерка и припасовка ложек	Вносим ложку в полость рта и смотрим Спрашиваем пациента, не давит ли ему Если границы ложки избыточны убирае Так же убираем пространство под вс щеки, чтобы под тяж было около 2-х мм - Между ложкой и переходной склад быть достаточно места для окантовоч не останеться, то клапана не будет и будет. - Ложку обязательно фрезеруем поднутрения. - Одна из важнейших ошибок связанн базис по границам нижней челюсти с в - Избыточная граница - это продавле очередь переснятие слепка. Если ос пациенту будет больно краем, он нев елозить, либо язык сувать под лож увеличивается. - После коррекции по границам л бороздки для большей ретенции оконт
Подготовка ложки к слепку	Далее для стабильной фиксации необх изготовление стоперов на инд. ложках Либо делаем их сами: смазываем адге обильно смачиваем водой гипсовые м ложки, замешиваем немного базы Спи 4 кусочка. Именно 4 - принцип стола на Укладываем ложку на модель и прида гипсом и ложкой было одинаковое расс Держать материал во рту не касаясь л

(c) 2026 Администратор <noreply@3072.ru smileterritory> | 2026-10-31 17:36
URL: https://edu.smileterritory.ru/content/124/356/ru/funkcionalʼnyj-ottisk-individualʼnoj-lozkoj.html

Поэтому надо поставить стопы, которы
- не дают продавиться ложке,
- стабилизируют инд ложку во рту в ед
- оказывают минимальное негативное д

Хорошо, когда есть зубы на челюсти
одной из этих точек стабилизации.

Как выбрать другие?
Места самой плотной и стабильной кос
Обычно это область клыков и
ретромалярными буграми. Там наилуч
манипуляции.

Первый этап оттиска - оконтовочный (проснимаем границы)

Пока стопы застывают, обрабатываем
далее смазываем лаком адгезивом нар
Смешиваем ложку базы и активатора В
Получается вязкая, липкая масса.
Скатываем тонкой колбаской и
окантовочный шприц.

Высушиваем полость рта при помощ
марлевыми шариками.

- По кругу выдавливаю массу Bisico
прилепляем к ложке,
- Потом вносим в рот и делаем сами фу
- Формируем тяжи и проснимаем
движений верхней и нижней губы
В/Ч: просим максимально открыть рот,
влево, свернуть губы в трубочку.
Н/Ч: просим максимально открыть рот
влево, выдвинуть язык вперед, дост
выдвинуть язык вперед, к небу, впра
трубочку и тд.)

ВАЖНО: снять маску и проговарив

(c) 2026 Администратор <noreply@3072.ru smileterritory> | 2026-10-31 17:36
URL: https://edu.smileterritory.ru/content/124/356/ru/funkcionalʼnyj-ottisk-individualʼnoj-lozkoj.html

пациент, САМИ ПОКАЗЫВАЕМ!!!!! стандартная ситуация, и он может вариант, показать ему все до слепка. Через минуту пробы повторяем, на слу

Ждем когда материал почти засты силиконовый, податливый и вытаскива Уже сейчас должна появиться присо ложку становится проблемой.
Снимать поэтому аккуратно! придерживаем окантовку к локжке, а саму ложку.

Второй этап оттиска

Высушиваем инд ложку. Обрабатываем её спирто элементом стабилизации в полости рта теперь больше не понадобяться.

Выдавливаем коррегирующую и активатор на палет В это время пациенту говорю сплюнуть, слюн пересушивая воздух и слизистую. Сушим слизо оттиском.

Быстро быстро замешиваем, держа шпатель макси снизить количество пузырей.

Консистенция коррегирующей массы должна бы внесении в ложку и в рот!
ЖИДКОЙ! Не слизеобразной!

Примерное соотношение массы 10 ед к активатору 8 Да, застывает чуть дольше, но снимает качестве участки.

Консистенция коррегирующей массы должна бы силикона из канюли! Тогда качество оттиска будет

Повторяем функциональные пробы из первого этапа для их переноса на функциональном оттиске.

Так же аккуратно извлекаем оттиск во избежании о

Оценка качества оттиска

Проверяем чтобы нигде не было пузы массы, тяжы должны быть просн

(c) 2026 Администратор <noreply@3072.ru smileterritory> | 2026-10-31 17:36

URL: https://edu.smileterritory.ru/content/124/356/ru/funkcionalʼnyj-ottisk-individualʼnoj-lozkoj.html

	соответсвовать состоянию в полости р верхней челюсти должны быть отч слепке. Любой вышеописанный недос за собой переснятие оттиска!
Обработка оттиска	Оттиск обрабатывается водой от вя ванночку с антисептиком на экспози орашается водой и отправляется в ЗТЛ

PS - Пациент не должен испытывать боли при одевании.
- Посмотреть, чтобы при открывании рта, ложка не сбрасывалась.

Ложка = платформа для всего
Хорошая ложка = точный оттиск = точный протез.

Запомни: индивидуальная ложка — это не вспомогательный инструмент, а часть конструкции будущего протеза. С ней начинается вся биомеханика, стабильность и комфорт.

Уникальный ID ответа: #1358
Опубликовал: : Алексей Данилов
Последние обновление: 2025-04-25 14:27

(c) 2026 Администратор <noreply@3072.ru smileterritory> | 2026-10-31 17:36
URL: https://edu.smileterritory.ru/content/124/356/ru/funkcionalʼnyj-ottisk-individualʼnoj-lozkoj.html