

# Алгоритмы работы. Аптечка. Неотложная помощь

## 1. Астматический статус

резкая нехватка кислорода, сложнейшее обострение бронхиальной астмы, продолжительного характера, сопровождающееся сужением просвета дыхательных путей до критических размеров.

### **Симптомы:**

- Приступ удушья (трудно вдохнуть еще труднее выдохнуть)
- Свистящие хрипы на выдохе слышны на расстоянии
- Вынужденное положение тела
- Бледность кожных покровов
- Возможен цианоз носогубного треугольника
- Дыхание шумное, область грудной клетки расширена

**Одышка до 20-22 раз в минуту ПРИСТУП!**

### **Неотложная помощь:**

1. Открыть окно, расстегнуть стесняющую одежду.
2. Привести в положение СИДЯ.
3. Ингаляция САЛЬБУТАМОЛОМ 2,5-5мг на 1 ингаляцию, не более 2 ингаляций, интервал 10 мин. (бронхорасширяющее действие).
4. Измерить АД.

**Если приступ удушья не прекратился, то ввести:**

**2-3 амп. (8-12 мг) ДЕКСАМЕТАЗОН в/в, если в/в не попадаем, то под язык или в/м в бедро.** (антиаллергическое, противошоковое для расслабления бронхиальной мускулатуры, особенности: повышает АД, может сильно покалывать при в/в введении).

**Детям 1-2 амп. (4-8 мг)**

При затяжном приступе обязательно вызвать **СКОРУЮ ПОМОЩЬ.**

**ВАЖНО!!! Анаприлин и Нитраты НЕЛЬЗЯ!!!**

Уникальный ID ответа: #1116

Опубликовал: : Алексей Данилов

Последние обновление: 2024-12-06 13:08