

# Алгоритмы работы. Аптечка. Неотложная помощь

## 2. Гипертонический криз

резкое и быстрое повышение артериального давления на короткий срок.

### **Симптомы:**

- Сжимающие боли в сердце
- Резкое повышение артериального давления на 20-50 единиц
- Сильная головная боль (в области затылка)
- Головокружение
- На коже и шее появляются красные пятна.
- Пелена перед глазами или мелькание мушек
- Слабость.
- Тошнота, рвота
- Тремор конечностей, судороги и выделение пота.
- В районе грудной клетки проявляется дискомфорт, и человек при этом сильно возбужден.
- Паника, страх смерти.

### **Неотложная помощь:**

1. Открыть окно, расстегнуть стесняющую одежду
2. Привести в положение полулежа, приподнять изголовье. Это создаст отток крови от головы.
3. Измерить АД
4. Спросить: «Какое Ваше рабочее АД? Какие препараты принимаете? Принимали ли Вы перед приёмом что-то? Есть ли аллергия на препараты?»
5. Если, поднялось на 20 Ед. и выше то:

- Под язык от 1-2,0 таблеток (разжевать) КАПТОПРИЛ (КАПОТЕН) 25 мг на 60-70 кг. пожилым (быстро понижает АД) действие наступает уже через 5 минут. (Уменьшает боль в груди)
- 1 таб. под язык (разжевать) АНАПРИЛИН 40 мг. – молодым и под «шафе» (быстро понижает АД, немеет во рту — значит действует, СРАЗУ ПРЕДУПРЕДИТЬ), (убирает тахикардию и страх).

6. Если АД без изменений или АД – 200/100мм/рт.,то:

- 2 мг. (2мл.) ПАПАВЕРИН 2% + 4 мг. (1мл) ДИБАЗОЛ 1% в/м или в/в (под контролем врача). (Смешиваются в одном шприце, вводить медленно).

**Осторожно: Не применяется при Сахарном диабете, лицам старше 60 лет.**

# Алгоритмы работы. Аптечка. Неотложная помощь

**1 амп. (10мл.) в/м или в/в МАГНИЯ СУЛЬФАТ 25%** (Спазмолитическое, противосудорожное, слабительное).

**Осторожно: при Сахарном диабете не колоть в/м - может развиться АБСЦЕСС!**

Если **АД** - поднялось более 60 Ед. и выше от нормы, стабильно не падает в течении 10 минут, то вызываем **СКОРУЮ ПОМОЩЬ**.

Уникальный ID ответа: #1117

Опубликовал: : Алексей Данилов

Последние обновление: 2024-12-06 13:33