

Алгоритмы работы. Аптечка. Неотложная помощь

3. Обморок и Острая сосудистая недостаточность - коллапс

характеризующаяся резким снижением артериального давления вследствие падения сосудистого тонуса, уменьшения сердечного выброса или в результате острого уменьшения объема циркулирующей крови.

Симптомы:

- Ощущение дурноты, головокружение, шум в ушах, нехватка воздуха, потеря сознания от 5 сек. до 1 мин.
- В период потери сознания зрачки расширены, реакция зрачков на свет снижена.
- АД падает до 40 мм.рт.ст. и ниже. Слабый пульс.
- Холодная, влажная, бледная кожа.
- Поверхностное и частое дыхание.
- Потускневший взгляд.

Неотложная помощь:

1 этап: «ОБМОРОК» (без сознания).

1. Открыть окно, расстегнуть стесняющую одежду
2. Привести в положение ЛЕЖА приподнять ноги (разложить кресло).
3. Поднести к носу тампон, смоченный в НАШАТЫРНОМ СПИРТЕ нужно растереть виски, мочки ушей.
4. Обрызгать лицо холодной водой пустером (делает врач или 2-ая м/с)
5. ИЗМЕРИТЬ АД.
6. 20 кап. с малым кол-вом воды КОРВАЛОЛ (успокаивает) поддержать под языком 20 секунд и проглотить.
7. При выходе из обморочного состояния сладкий чай, приток свежего воздуха.
8. Если после 5 минут не пришёл в сознание вызвать скорую помощь ч/з 3-е лицо.

2 этап:

1. 1 амп. (1,0 мл) в/м, подкожно КОФЕИН 10 % (расширяет сосуды сердца)
2. Вызвать СКОРУЮ ПОМОЩЬ через третье лицо.

3 этап: «КОЛЛАПС» (сознание).

АД снижается на 20-30 Ед. от нормы:

- **2-3 амп. (8-12 мг) ДЕКСАМЕТАЗОН в/в, если в/в не попадаем, то под язык или в/м в бедро.** (антиаллергическое, противошоковое для расслабления бронхиальной мускулатуры, особенности: повышает АД, страница 1 / 2

Алгоритмы работы. Аптечка. Неотложная помощь

может сильно покалывать при в/в введение).

Детям 1-2 амп. (4-8 мг)

Если АД ниже 60/40, то:

- **0,5-1 амп. в/в 0,1 % р-р АДРЕНАЛИНА если в/в не попадаем, ввести сублингвально** (под корень языка, так как он обильно кровоснабжается). (Усиление и учащение сердечных сокращений, повышает АД, расслабляет гладкие мышцы бронхов. Терапевтический эффект через 1-2 мин. при в/в. При в/м - минимальный эффект через 5—10 минут после введения, а максимальный через 20 минут).
- **Ставим систему 1 флакон (200 мл) Физ.Раствор 0,9%.**

Детям 0,3-0.5 амп .

Уникальный ID ответа: #1118

Опубликовал: : Алексей Данилов

Последние обновление: 2024-12-06 14:10