Алгоритмы работы. Аптечка. Неотложная помощь

5.1 Введение агрессивной жидкости

Это неотложное состояние связано с введением пациенту вместо анестетика агрессивной жидкости — этилового или нашатырного спирта, перекиси водорода.

Симптомы:

- Чувство жжения в области инъекции.
- Жалобы на сильные распирающие боли.
- Беспокойное поведение. Обнаружение флаконов, содержащих введенное по ошибке вещество.

Неотложная помощь:

1. Произвести разрез и ПРОМЫТЬ ОБЛАСТЬ введения **ФИЗ. РАСТВОРОМ 0,9% (Делает врач)**.
2. **2 амп. (2 мл) в/м ДИМЕДРОЛ 1%** (противоаллергический, антигистаминный препарат, обладает седативным действием. Для лечения аллергических заболеваний) **1 амп (2 мл) только в/м Анальгин 50%** (жаропонижающее, обезболивающее действие).

Уникальный ID ответа: #1120
Опубликовал: : Алексей Данилов
Последние обновление: 2024-12-06 14:46

(c) 2026 Администратор <noreply@3072.ru smileterritory> | 2026-11-01 19:12
URL: https://edu.smileterritory.ru/content/82/121/ru/51-vvedenie-agressivnoj-zidkosti.html