

# Алгоритмы работы. Аптечка. Неотложная помощь

## 7. Судорожный синдром

### Эпилепсия

является неспецифической реакцией организма на внешние и внутренние раздражители, для которой характерны внезапные и непроизвольные приступы мышечных сокращений.

#### **Симптомы:**

- Судорожные припадки охватывают все тело пациента и сопровождаются пеной у рта.
- Потерей сознания.
- Прикусом языка и периодической остановкой дыхания. Непроизвольной дефекацией или мочеиспусканием.

#### **Неотложная помощь:**

1. Вызвать **СКОРУЮ ПОМОЩЬ** через третье лицо. **5-6 минут судороги, медленно выходит из состояния.**

**СКАЗАТЬ СКОРОЙ: «У человека начались судорожные припадки и ему нужна неотложная помощь!»**

2. Правильно уложить больного на бок и придерживаем ноги и голову на кресле, для предупреждения случайных травм и западения языка. В рот ничего не вставляем.

3. **1 амп. (1мл) в/м ФЕНОЗЕПАМ 1 %** (противосудорожное действие) **P.S. БЕРЕМЕННЫМ НЕЛЬЗЯ.**

**Детям 0.5 амп .**

Уникальный ID ответа: #1124

Опубликовал: : Алексей Данилов

Последние обновление: 2024-12-06 15:13