

Алгоритмы работы. Аптечка. Неотложная помощь

9. Сахарный диабет

хроническое нарушение обмена веществ, в основе которого лежит дефицит образования собственного инсулина и повышение уровня глюкозы в крови. (У больных диабетом часто возникают пародонтальные абсцессы и пролиферация десны. Могут наблюдаться сухость слизистой оболочки полости рта, спонтанная кровоточивость десен, припухлость и болезненность десен, сухость губ и подвижность зубов. Хроническая патология полости рта, в частности пародонтит, может затруднять контроль диабета.)



Симптомы:

- Сонливость
- Головная боль

Гипогликемия

- Внезапно теряет сознание.
- Чувство голода.
- Слабость.
- Пациент потеет (проступает липкий холодный пот).
- Головокружение.
- Пациента преследует зевота.
- Пациент может испытывать беспричинное чувство страха.
- Кожа бледнеет.

Гипергликемия

- отсутствие аппетита;
- тошнота;
- жажда и ощущение су
- обложененный язык;
- запах ацетона изо рта;
- диспепсические расстр
- кишечного тракта;
- снижение давления;
- апатия;
- амнезия;
- низкий мышечный тону
- учащение мочеиспуска

Неотложная помощь:

1. Открыть окно. **Голову на бок, язык в нижнюю челюсть**

страница 1 / 2

(с) 2026 Администратор <noreply@3072.ru smileterritory> | 2026-01-02 09:49

URL: <https://edu.smileterritory.ru/content/82/127/ru/9-saharnyj-diabet.html>

Алгоритмы работы. Аптечка. Неотложная помощь

- 2. Спросить про Сахарный диабет.**
- 3. Измерить сахар Сетталиты-экспресс глюкометр**

Инструкция измерения уровня сахара глюкометром:

1. Включить (нажать Ок)
2. Зарядить ручку, открутить на ней колпачек
3. Вставить иглу (серого цвета) в ручку и окрутить верхнюю часть
4. Закрутить крышку ручки
5. Выбрать «Настройки» и нажать «Ок» и выбрать стрелочкой вниз «Контрольный Тест» и нажать «Ок»
6. Вставить тест-полоску вглюкометр
7. Сделать прокол в безымянном пальце, оттянув регулятор на ручке назад, затем нажать на круглую кнопку
8. Нанести каплю крови на ребро края тест полоски, не задевая ее пальцем
9. Посмотреть результат в течении 5 сек
10. Выключить (нажать Ок)

4. Измерить АД

Вызвать **СКОРУЮ ПОМОЩЬ** через третье лицо.

Гипогликемия

Если запах ацетона

- 1) Дать пациенту съесть 4-5 кусков сахара или выпить стакан очень сладкой воды. (Конфеты, печенье и шоколад)
- 2) В/в ввести 20-40 мл **40% Р-РА ГЛЮКОЗЫ** (если не получается под язык чайной ложкой)
- 3) После восстановления сознаний дать сладкий чай.

- 1) Горизонтальное положение
- 2) Осуществлять контроль за (не запал!)
- 3) **Ставим систему 1 ф. РАСТВОРА 0,9%**
- 4) **1амп. (1,0мг) в/м КОФЕ** учащает и углубляет дыхание сердца, умеренное диуретическое
- 5) В ожидании приезда сознания и может глотать побольше воды (соленной).

Уникальный ID ответа: #1126

Опубликовал: : Алексей Данилов

Последние обновление: 2024-12-06 16:32