Алгоритмы работы. Аптечка. Неотложная помощь
11. Инсульт

связанная с нарушением мозгового кровообращения, в результате чего в определенных участках мозга снижается или же полностью прекращается кровоток.

Симптомы:

- появление неожиданной слабости, онемения или паралича мышц лица, руки или ноги, обычно с одной стороны тела;
- необычное затруднение или нарушение речи;
- резкое ухудшение зрения одного или обоих глаз;
- неожиданное нарушение походки, головокружение, потеря равновесия или координации;
- острые головные боли без каких-либо понятных причин.

Неотложная помощь:



1. Проба УЗП
2. Вызвать СКОРУЮ ПОМОЩЬ через 3-е лицо
3. Открыть окно, расстегнуть стесняющую одежду
4. Привести в положение полулежа, приподнять изголовья. Это создаст отток крови от головы
5. Измерить АД
6. При наличии рвоты повернуть голову пациента набок и очистить ротовую полость.
7. АД выше 180/90 (АД меньше 160/100 не снижаем!!!)

· **Сублингвально (под язык) от 0,5-2,0 таблеток КАПТОПРИЛ (КАПОТЕН) 25 мг, (быстро понижает АД) действие наступает уже *через 5 минут*. (Уменьшает боль в груди)**

Уникальный ID ответа: #1128
Опубликовал: : Алексей Данилов
Последние обновление: 2024-12-06 16:06

(c) 2026 Администратор <noreply@3072.ru smileterritory> | 2026-11-01 17:58
URL: https://edu.smileterritory.ru/content/82/129/ru/11-insul’t.html