

# Алгоритмы работы. Аптечка. Неотложная помощь

## 11. Инсульт

связанная с нарушением мозгового кровообращения, в результате чего в определенных участках мозга снижается или же полностью прекращается кровоток.

### **Симптомы:**

- появление неожиданной слабости, онемения или паралича мышц лица, руки или ноги, обычно с одной стороны тела;
- необычное затруднение или нарушение речи;
- резкое ухудшение зрения одного или обоих глаз;
- неожиданное нарушение походки, головокружение, потеря равновесия или координации;
- острые головные боли без каких-либо понятных причин.

### **Неотложная помощь:**

 <b>Улыбнись!</b>		
<b>Улыбнуться</b>	<b>Заговорить</b>	<b>Поднять обе руки</b>

1. Проба УЗП
2. Вызвать СКОРУЮ ПОМОЩЬ через 3-е лицо
3. Открыть окно, расстегнуть стесняющую одежду
4. Привести в положение полулежачего, приподнять изголовья. Это создаст отток крови от головы
5. Измерить АД
6. При наличии рвоты повернуть голову пациента набок и очистить ротовую полость.
7. АД выше 180/90 (АД меньше 160/100 не снижаем!!!)

• **Сублингвально (под язык) от 0,5-2,0 таблеток КАПТОПРИЛ (КАПОТЕН) 25 мг, (быстро понижает АД) действие наступает уже через 5 минут. (Уменьшает боль в груди)**

Уникальный ID ответа: #1128

Опубликовал: : Алексей Данилов

Последнее обновление: 2024-12-06 16:06