
Алгоритмы работы. Аптечка. Неотложная помощь
12. Инородное тело верхних дыхательных путей

Неотложная помощь:

В сознании: прием Геймлиха






Коникотомия

Положить пациента на спину с запрокинутой головой и подложенным под лапатки валиком.

(c) 2026 Администратор <noreply@3072.ru smileterritory> | 2026-10-31 16:44
URL: https://edu.smileterritory.ru/content/82/130/ru/12-inorodnoe-telo-verhnih-dyhatelʹnyh-putej.html

Алгоритмы работы. Аптечка. Неотложная помощь



1. Указательным пальцем нащупать промежуток между щитовидным и перстневидным хрящами.
2. Зафиксировать щитовидный хрящ 1 и 2 пальцами левой руки (для левшей –наоборот).
3. Пальцами правой руки захватить режущий инструмент на два сантиметра от острия.
4. Правой рукой сделать поперечный разрез до 2 см длиной, одномоментно рассекая кожу и коническую связку.
5. Расширитель трахеи ввести в направлении киля трахеи, по нему ввести трахеостомическую трубку и удалить расширитель.

Уникальный ID ответа: #1129
Опубликовал: : Алексей Данилов
Последние обновление: 2024-12-06 16:12

(c) 2026 Администратор <noreply@3072.ru smileterritory> | 2026-10-31 16:44
URL: https://edu.smileterritory.ru/content/82/130/ru/12-inorodnoe-telo-verhnih-dyhatelʹnyh-putej.html